Memoire et observation sur une Playe au Bras par M. fabre, Mtre en Chirurgie à Corder d'Alby.

Le, cas particulier qui a donné lieu à la machine que je soumets aujourd'hui au jugement de l'academie de Chirurgie est rare et le premier peut etre qui ait été observé jusquici; aussi m'a t-il paru meriter attention. Je sais qu'il n'ajoûtera rien aux connoissances Chirurgicales, puisque la réunion et cicatrice des parties ligamenteuses et membraneuses a été prouvée par une infinité d'observations; mais outre que le moyen au quel je dois la santé du malade dont il s'agit, pourra servir dans un cas pareil, il peut aussi se présenter des occasions où il sera possible de tirer quelque utilité par voie d'analogie et d'imitation. Voici en peu de mots ce dont il s'agit.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

A. RC 58 n° 65

Un Laboureur reçut un coup de sabre sur la partie superieure du Bras qui divisa de derrière en avant le Muscle Deltoïde la partie supérieure du sous-épineux et la Capsule articulaire, de manière que la tête de l'humerus et la Cavité Glénoïde de l'Omoplate étoient à découvert. Je ne vis le malade que 24 heures après son accident, et la plaie avoit à peu près 4 pouces de long et 3 de large, à cause de la mauvaise situation où on avoit tenu le Bras pendant tout ce tems (on avoit emmailloté le malade comme un enfant qui vient de naître.) Mon premier soin fut de nettoyer la plaie, de tâcher de prévenir le retour de l'hémorragie qui avoit été considérable, et de donner au Bras la situation la plus favorable à la cicatrice; mais la grande difficulté étoit d'assujettir la plaie pour chercher une situation commode, soit pour pourvoir aux nécessités de la vie, soit afin, que ceux qu'entrainoit nécessairement le

pansement, ne portassent point obstacle à la cicatrice qu'une bonne suppuration nous donnoit lieu d'espérer; après avoir tenté inutilement tous les moyens que mon industrie et celle d'un de mes Confrères put suggérer, je lui fis faire un Corset de Tole rembourré (le fer blanc ayant été trop foible) qu'on assujettit avec des boucles, à l'échancrure qui devoit loger le bras malade, on ajusta par le moyen d'une charnière une pièce de même matière en forme de canal qu'on pouvoit assujettir à un point plus ou moins élevé par des crochets, le Bras étoit ainsi soutenu commodément dans une situation horisontale propre à rapprocher d'une manière fixe et permanente les bords de la plaie. Le succès a répondu à mon attente; le malade après avoir porté pendant 40 jours son Corset sans beaucoup de gêne et sans inconvénient a recouvré tous les mouvemens du Bras. Le tems lui rendra les forces nécessaires pour vaquer au labourage et aux autres travaux de la campagne.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Je supprime ici les divers accidens qui sont arrivés dans le traitement, le manque de Régime les avoit produits, on y a remedié par les moyens les plus convenables, mais c'est étranger à notre sujet, d'autant qu'ils ne presentent rien de particulier ni d'interessant.